

Asma bronquial en pacientes con ideación de Autolisis

M.P. Lobato De La Sierra, A. Padilla Galo, B. Valencia Azcona, C. Puchaes Manchon, L. Lamrini Hamido-Laarbi, J. Rojas Villegas, J.G. Soto Campos.

UGC de Neumología del Hospital de Jerez de la Frontera


UGC de Neumología del Hospital Costa del Sol

UGC de Neumología del Hospital Juan Ramón Jimenez

UGC de Neumología del Hospital Universitario de Jaen

UGC de prevención, promoción y vigilancia de la salud de Jerez de la Frontera

Introducción



Detectar la prevalencia de asma entre pacientes que acuden a urgencias hospitalarias por intentos de suicidio y caracterizar la enfermedad en estos.


Materiales y métodos

Reclutamos un total de 443 pacientes pertenecientes a los Hospitales Costa del Sol, Hospital de Jaen y Hospital de Jerez de la Frontera en 2019. Identificandose por medio de diagnóstico de intento autolítico en episodio de urgencias.

	Descripción de la población (N:443)
Edad (media)	41,78 años
Sexo (%)	F 62,7%
Tabaco (%)	NF: 65.46% ; F 30,02%; ExF 4,52%
Alcohol (%)	23,48%
Patología respiratoria (%)	55 (12,42%)
Asma (%)	33 (8,35%)
Eosinófilos (media)	162 cels/ μ L


Resultados

PREVALENCIA



Eosinófilos (Media): 162 cels/ μ L

GRAVEDAD



Montelukast: 25 pacientes



Conclusiones

Se deduce de estos resultados preliminares es que el asma es la enfermedad respiratoria más prevalente en aquellos pacientes que han realizado un intento de suicidio.

Esto puede dar pie a otros estudios a con el fin de de obtener una muestra mayor y definir algo mejor las características de los pacientes asmáticos que presentan ideación suicida con intento de autolisis

¡MUCHAS GRACIAS!

