

UN INFORME DE NEUMATÓLOGOS DEL INFANTA ALERTA DEL RIESGO EN LA DEMORA DE LA PRIMERA CONSULTA

## El 30% de pacientes con posible cáncer de pulmón tarda un mes en ir al médico

Más de la mitad infravaloran sus factores de riesgo, según un estudio

Twitter Me gusta 0

Enviar Imprimir Valorar Añade a tu blog 0 Comentarios

REDACCION 22/03/2014

Tres de cada diez pacientes con síntomas de padecer un cáncer de pulmón tarda más de un mes en hacer su primera consulta al médico; el 55% de los pacientes atendidos en el Complejo Universitario Infanta Cristina, de Badajoz, estimaban que sus factores de riesgo eran bajos y el 58% de ellos reconocía que su información sobre la enfermedad era nula. Estos son algunos de los datos que se recogen en un estudio realizado por un equipo de ocho neumatólogos del citado hospital pancese, tras analizar en 131 casos los factores de la demora en realizar la primera consulta, según señala en nota de prensa la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (Neumosur).

La conclusión del estudio de los médicos del centro hospitalario es que "la percepción del riesgo y los conocimientos sobre cáncer de pulmón son insuficientes" en la población. Y que "existe una preocupante tendencia a infravalorar" sus síntomas, especialmente algunos de ellos como la disfonía (pérdida de calidad de la voz).

**SINTOMAS MINIMIZADOS** Hay otros síntomas minimizados por los pacientes, como haber trabajado en un ambiente con humos, aumento de la disnea, la fatiga, la pérdida de peso, anorexia y el dolor.

El antecedente de cáncer previo y el de patología cardíaca son, en cambio, los factores que sí se asocian en la investigación a una menor demora, según un informe de Neumosur. La investigación indica que el nivel de formación, la situación laboral, la distancia al hospital o vivir en el ámbito rural no se relacionaron con una mayor demora. El tiempo medio en acudir a la primera consulta después de aparecer los síntomas fue de 10 días; en un 26,7% de casos el retraso superó los 30 días.

Además, un 88,6% de pacientes eran hombres, con una edad media de 62 años; el 73,3% carecía de estudios secundarios; el 50,4% vivía en el ámbito rural; un 38,6% era fumador activo; y el 91,7% reconocía cierta exposición a productos cancerígenos.

Además, el 29,5% tenía antecedentes familiares de cáncer y un 83% tenía comorbilidades --19% cáncer previo, 60% patología cardiovascular, 29% digestiva, 23% EPOC previa--

El citado estudio será presentado en el 40 Congreso Neumosur, que reunirá en Jerez de la Frontera a más de 250 especialistas neumólogos y cirujanos torácicos de Andalucía y Extremadura.

PUBLICIDAD

SEAT  
NUEVO SEAT IBIZA I-TECH POR  
8.900€  
CON SEGURO A TODO RIESGO  
Y 3.000€ EN EQUIPAMIENTO  
DE REGALO  
LO QUIERO >>>  
ENJOYNEERING

### Las noticias más...

Leídas Valoradas Comentadas Enviadas

1. El Cristo de Amor sale en procesión por la alcazaba
2. Malú actuará el 28 de junio en el ferial
3. La diputación obtiene 58 millones de remanente al liquidar las cuentas de 2013
4. La Malagueta se vuelca con Martina, mi princesa Rett
5. Los consejeros y altos cargos publicarán su sueldo en la web del Gobierno regional
6. Fuerte de San Cristóbal
7. La Feria del Mueble, del 3 al 6 de abril en Ifeba
8. 300 técnicos y cargos electos buscan cómo aplicar lo mejor de la reforma local
9. El Torneo de Golf El Corte Inglés apoya a la AECC
10. Mujeres Rurales celebra un festival solidario