

Compartir

[f Recomendar](#) 0
[t Twitter](#) 1
[in Compartir](#)
[G+1](#) 0
[i](#) [g](#) [e](#) | [+](#)

Herramientas


[Valorar](#) [0]

[Imprimir](#) [Enviar](#)

ESPECIALIZADA /

Los pacientes con OCD y dislipemia o depresión presentan peor grado de supervivencia

Imágenes



Temas relacionados: [del Mar](#) · [Pacientes](#) · [Investigación](#) · [Diabetes](#) · [Depresión](#) · [EPOC](#) · [Tabaquismo](#) · [Alergia](#) · [apnea del sueño](#) · [Hipertensión pulmonar](#)

GACETA MÉDICA / BARCELONA

[@GacetaMedicaCom](#)

martes, 22 de septiembre de 2015 / 14:00

Los pacientes que tienen prescrita oxigenoterapia domiciliar de forma crónica (OCD) tienen peor supervivencia si entre las comorbilidades asociadas se encuentran la dislipemia y la depresión. Así se desprende de un estudio elaborado por especialistas de Neumosur (la sociedad científica que aglutina a los neumólogos y cirujanos torácicos del sur de España) que desempeñan su labor profesional en la Unidad de Gestión Clínica de Neumología y Alergia del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Este trabajo de investigación también detalla cómo otras comorbilidades estudiadas no presentan peor grado de supervivencia. Es el caso de la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo y la hipertensión pulmonar. Asimismo, la presencia de EPOC o SAHS (Síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño) también se asociaron a un mayor grado de supervivencia de los pacientes analizados en este estudio, comparado con pacientes que presentaban otras patologías.

En España se administran más de 480.000 tratamientos asociados a las terapias respiratorias domiciliarias. La OD (Oxigenoterapia Domiciliar) y la CPAP (presión positiva continua en la vía aérea) que consiste en el suministro de aire a presión continuada positiva durante el sueño en pacientes con el Síndrome de Apnea del Sueño son los tratamientos más indicados.